


« Diabète et santé bucco-dentaire : quels liens ? »



30 janvier 2026



Dr Blandine Tramunt, médecin diabétologue au CHU de Toulouse
Dr Philippe Jourdan, chirurgien-dentiste et président de l'URPS Chirurgiens-dentistes Occitanie



À destination de tous.les acteur.rices impliqués.es dans le parcours de soin des personnes vivant avec un diabète de type 2

1 La parodontopathie

- ✓ Environ 50% des Français de plus de 50 ans sont touchés par une maladie parodontale.
- ✓ C'est une dysbiose orale qui entraîne une inflammation des tissus de soutien de la dent.
- ✓ Le diagnostic est réalisé par un sondage de la poche parodontale, par un bilan radiologique ou par un test bactérien parodontal.

2 Diabète et parodontopathie : une relation bidirectionnelle



Le diabète

- ✓ C'est un facteur de risque indépendant de parodontopathie.
- ✓ Il augmente la sévérité et l'étendue de la parodontopathie et accélère sa progression.

- ✓ C'est une complication chronique du diabète.
- ✓ C'est un facteur de déséquilibre glycémique chez les patients vivant avec un diabète de type 2.
- ✓ Elle pourrait participer à la survenue et/ou à la progression des complications chroniques du diabète.
- ✓ Elle augmente le risque de diabète de type 2 en population générale.



La parodontopathie



**Traiter la parodontopathie améliore l'équilibre glycémique :
diminution de l'HbA1c de l'ordre de 0,4%.**

3 En pratique, que mettre en place ?



Repérer

- ✓ Repérer les signes de parodontopathie comme les gencives rouges et gonflées et les saignements de la gencive.
- ✓ Penser à la parodontopathie en cas de déséquilibre glycémique.

- ✓ Intégrer le dépistage de la parodontopathie dans le bilan des complications chroniques du diabète.
- ✓ Dépister le diabète de type 2 chez un patient présentant une parodontopathie.

Dépister



Fiche « J'organise mon dépistage des complications chroniques du diabète », Diabète Occitanie : [lien](#)



Éduquer

- ✓ Sensibiliser les patients aux liens entre diabète et parodontopathie.
- ✓ Promouvoir l'hygiène et la santé bucco-dentaire.

- ✓ Orienter vers un chirurgien-dentiste (consultation bi-annuelle recommandée).

Orienter



4 Prise en charge financière du traitement de la parodontopathie

- ✓ **Sont pris en charge pour les patients en ALD diabète de type 1 et 2 :**
 - le bilan parodontal de dépistage 1 fois par an ;
 - les actes d'assainissement parodontal (détartrage-surfaçage radiculaire) : la prise en charge est limitée à un traitement initial et à un traitement complémentaire en cas de persistance des lésions par période de 3 ans.



Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l'enregistrement et le support du webinar sur notre [site internet](#).